

Recomanacions després de la perforació del lòbul de l'orella

DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA

Perforar els lòbuls de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril i d'un sol ús.

RISCOS SANITARIS I COMPLICACIONS ASSOCIATS A LA PRÀCTICA

- Possibilitat d'una infecció bacteriana. El microorganisme es pot introduir amb el pírcing en dos moments diferents: **a)** durant la seva col·locació **b)** durant la cicatrització per falta de desinfecció o higiene de la ferida o per manipulació del pírcing.
- La cicatrització de la zona dura diverses setmanes. Aquest període, però, és molt variable. Això obliga a aplicar mesures de desinfecció mentre la ferida esta oberta. Es pot utilitzar un antisèptic i mantenir sempre una bona higiene corporal.
- En els casos en què aparegui una infecció s'ha de consultar el metge.

CURES NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR LA CICATRITZACIÓ

Consells postractament de la zona afectada.

- Aplicar diàriament un antisèptic o sèrum fisiològic amb una gasa estèril.
- Mantenir la zona seca.
- No rascar la ferida.
- La primera setmana, evitar el sol, les saunes, les piscines i les platges.
- Si apareix qualsevol reacció o alteració, s'ha de consultar el metge o el farmacèutic.

....., de/d' del

Signatura de l'usuari

Signatura del personal aplicador

Si és el cas, signatura del representant legal per acreditar la maduresa suficient del menor per prestar el consentiment

Recomanacions després de la perforació del lòbul de l'orella

DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA

Perforar els lòbuls de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril i d'un sol ús.

RISCOS SANITARIS I COMPLICACIONS ASSOCIATS A LA PRÀCTICA

- Possibilitat d'una infecció bacteriana. El microorganisme es pot introduir amb el pírcing en dos moments diferents: **a)** durant la seva col·locació **b)** durant la cicatrització per falta de desinfecció o higiene de la ferida o per manipulació del pírcing.
- La cicatrització de la zona dura diverses setmanes. Aquest període, però, és molt variable. Això obliga a aplicar mesures de desinfecció mentre la ferida esta oberta. Es pot utilitzar un antisèptic i mantenir sempre una bona higiene corporal.
- En els casos en què aparegui una infecció s'ha de consultar el metge.

CURES NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR LA CICATRITZACIÓ

Consells postractament de la zona afectada.

- Aplicar diàriament un antisèptic o sèrum fisiològic amb una gasa estèril.
- Mantenir la zona seca.
- No rascar la ferida.
- La primera setmana, evitar el sol, les saunes, les piscines i les platges.
- Si apareix qualsevol reacció o alteració, s'ha de consultar el metge o el farmacèutic.

....., de/d' del

Signatura de l'usuari

Signatura del personal aplicador

Si és el cas, signatura del representant legal per acreditar la maduresa suficient del menor per prestar el consentiment